



BOLI MNIE



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skala bólu u dorosłych

Jeśli pacjent ma trudności ze wskazaniem, użyj proszę „skanowania wspomaganego przez partnera”. Zrób to w następujący sposób:

Poproś partnera o skupienie się na tablicy komunikacyjnej.

Ustal, w jaki sposób pacjent zakomunikuje „Tak” (tj. kiwanie głową, mruganie, kciuk w górę itp.).

1. Przejdź komórka po komórce w skali bólu. Wskaż każdy element i zapytaj, czy to jest poziom bólu pacjenta.
2. Pacjent zasygnalizuje żądaną wartość skali bólu przy użyciu ustalonej odpowiedzi TAK.
3. Potwierdź wybór pacjenta i powtórz w razie potrzeby.

Dodatkowe uwagi:



- Dodatkowe uwagi:
- Trzymaj tablicę około 30 cm od twarzy pacjenta
- Upewnij się, że jest odpowiednie światło, pozycja głowy oraz widzenie pacjenta
- Mów głośno i wyraźnie używając prostego języka.
- Noszenie maseczki oraz innych środków ochrony osobistej może utrudniać pacjentowi zrozumienie tego, co mówisz. Rozważ użycie tablicy komunikacyjnej podczas tej rozmowy.
- Jeśli nie możesz użyć tych narzędzi efektywnie w chwili obecnej, nie oznacza to, że nie będziesz mógł użyć ich poprawnie później tego dnia, jutro lub w tym tygodniu. Próbuje używać narzędzi wspomagających komunikowanie się.

